

Per l'anno scolastico 2021/2022, a livello nazionale è prevista l'attuazione del
"Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado"
con l'esecuzione di test salivari ogni 15 gg

L'adesione al Piano è su base volontaria.

- Il test molecolare salivare permette di rilevare la presenza dei geni virus SARS-CoV-2 anche nella saliva di persone senza sintomi o con sintomi lievi. Utilizzeremo il kit con LolliSponge
- Inizialmente il test verrà eseguito a scuola con l'aiuto degli operatori sanitari. Nelle prossime settimane verrà eseguito autonomamente a casa, con l'aiuto dei genitori
- il test dovrà essere consegnato a scuola la mattina entro le ore 9, secondo un calendario definito.




MODALITA' D'USO DEL DISPOSITIVO DI PRELIEVO SALIVARE LolliSponge

IL DISPOSITIVO E' PRONTO ALL'USO E NON RICHIEDE ALCUNA FASE DI PREPARAZIONE

CONTENUTO

Copan LolliSponge™ è un dispositivo costituito da una provetta in plastica etichettata con un tappo a vite. Il tappo presenta un bastoncino con spugne assorbenti. Copan LolliSponge™ è fornito all'interno di una busta trasparente.



PRIMA DI INIZIARE...

1

LAVARSI LE MANI
CON ACQUA E SAPONE
SCIACQUARLE
ASCIUGARLE
O IGIENIZZARLE

Prima di iniziare ricorda di rimuovere eventuali monili

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi



0 Bagna le mani con l'acqua



1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



2 friziona le mani palmo contro palmo



3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro



8 Risciacqua le mani con l'acqua



9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso



10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto



11...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.




SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto, o lavato i denti




2

APRIRE LA PROVETTA TENENDO IL DISPOSITIVO
DAL TAPPO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2

3

INSERIRE IL DISPOSITIVO ALL'INTERNO DELLA BOCCA E MUOVERLO
ELICATAMENTE ALL'INTERNO NELLA PARTE SUPERIORE DELLA LINGUA
TRA I DENTI E LA GUANCIA,
PER 60 SECONDI IN MODO DA INUMIDIRE BENE LE SPUGNE



NON FORZARE O PREMERE ECCESSIVAMENTE
NON TOCCARE CON LE MANI LA SPUGNETTA
NON MORDERLA CON I DENTI LA SPUGNETTA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2

4

POSIZIONARE IL TAPPO SULLA PROVETTA RIAVVITARLO CHIUDERE
SALDAMENTE LA PROVETTA
E RESTITUIRE IL DISPOSITIVO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

E' stato realizzato il presente Flyer per riassumere in modo semplice e chiaro i quattro passaggi per la raccolta della saliva con il kit provetta Lollisponge.



**MONITORAGGIO TEST SALIVARI NELLE SCUOLE
RIPARTIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA!!**

In che modo?
Per l'anno scolastico 2021/2022, a livello nazionale è prevista l'attuazione del "Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado" con l'esecuzione di test salivari ogni 15 gg. L'adesione al Piano è su base volontaria.

Cosa sono i test salivari molecolari?
Il test molecolare salivare permette di rilevare la presenza del gene virus SARS-CoV-2 anche nella saliva di persone senza sintomi o con sintomi lievi. Utilizzavamo il kit con provetta Lollisponge.

Cosa facciamo oggi?
Oggi, tutti quanti insieme facciamo il test salivare. Nelle prossime settimane lo eseguirate autonomamente a casa, con l'aiuto dei genitori ed il test dovrà essere consegnato a scuola la mattina entro le ore 9, secondo un calendario definito. Per tale motivo, il personale sanitario vi darà tutte le informazioni per aiutarvi ad eseguire il test correttamente.

Come si esegue il test salivare?
ATTENZIONE! La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver mangiato, bevuto o lavato i denti - Non inserire saliva direttamente nella provetta e non mordere la spugna. La parte spugnosa non deve toccare altre superfici o altre parti del corpo diversa dalla bocca.

1. Lavarsi le mani e aprire il tappo della provetta Lollisponge. Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.

2. Inserire il dispositivo all'interno della bocca.

3. Stare con delicatamente il dispositivo dentro la bocca mantenendolo fermo sopra la lingua e che tocca le guance per almeno 30 sec.

4. Inserire il tappo nella provetta Lollisponge e assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO!!

A cura di: Servizi che promuovono Salute, BCC Scuola
Brescia - Via della Spina, 10 - 37139 Brescia